

<顔>		S①様(56歳)		H①さん(51歳)		K様(43歳)		T様(43歳)		I①様(42歳)		I②様(42歳)		S②様(48歳)		S③様(36歳)		院長(48歳)		H②さん(44歳)		Yさん(44歳)											
元の血小板数		39.7(×10 ⁴ /mm ³)		26.4		38.4		28.7		22		19.4		21.5		19.8		24		19.6		20.8											
		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L										
P	作製方法	既製品	柴田式	既製品	柴(+T)	柴(+T)	既製品	柴(+T)	既製品	既製品	柴田式	柴田式	既製品	柴田式	柴(+T)	柴(+T)	柴田式	既製品	柴田式	柴(+T)		既製品	柴(+T)										
R	血小板濃度	53	246	59	178	173	50	173	45	41	116	159	34	87	87	134	134	31	175	244		62	227										
P	濃縮度	1.3倍	6倍	2倍	7倍	4.5倍	1.3倍	6倍	1.6倍	2倍	5倍	8倍	2倍	4.5倍	4.5倍	7倍	7倍	1.5倍	7.2倍	12倍		3倍	11倍										
	注入量(cc)	2	1.5	2.5	3	3.8	3	2	2.5	2.8	3	3	2.5	1.5	1.5	2	1	5	6	3		2.5	2.6										
目	クマ(たるみ)	○	◎	○	○	◎	△	◎	○	△	○	○	×	◎	◎	◎	◎	×	◎	◎		△	○										
下	クマ(色)	×	△	○	○	○	×	○	△	△	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○		△	△										
	シワ	○	◎	×	○	◎	△	○	△	△	○	○	×	○	○	○	○	×	○	◎		×	◎										
目尻	シワ	○	◎	×	○	◎	△	○	△	△	○	○	×	○	○	○	○	×	○	◎		×	◎										
口	ほうれい線	○	◎	○	◎	◎	○	◎	○	△	◎	◎	×	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎		△	○										
元	口角たるみ	○	◎	△	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	○	△	◎	○		×	○										
頬	たるみ	○	◎	△	◎	◎	○	◎	○	△	◎	△	×	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎		△	○										
	へこみ	○	◎	△	◎	◎	○	◎	○	△	◎	△	×	◎	◎	◎	◎	△	◎	◎		△	○										
額	シワ	△	○	△	○	×	×	×	×	×	◎	◎	×	○	○	○	○	×	○	○		×	○										
眉間	シワ	○	◎	×	○	◎	△	○	△	△	○	○	×	○	○	○	○	×	○	△		×	△										
	毛穴	○	◎	○	○	◎	△	○	△	△	○	○	×	○	○	○	○	△	○	○		○	○										
	ニキビ・ニキビ跡	○	◎	○	○	◎	△	○	△	△	○	○	×	○	○	○	○	△	○	○		○	○										
	肌状態・感想など	乾燥なくなり、ハリが出た。目の下は4週で完璧！		乾燥！少しふっくら(左より1ヶ月遅れ)		ふっくら・プルプル！右と全然違う！		乾燥↓↓ハリ↑↑化粧崩れ↓		乾燥！ツルツル！ハリ↑柔らかく化粧のりいい		手触りはいい		すごくハリが出てふっくら・もちもち		ふっくら・ツルツル油浮き・化粧崩れ減った		手触りはいい		手触り、化粧のりいい。目の下・口元もすごくいい感じ！		皮脂・赤味減り、色白く、キメ細かくなった		若干手触りいい		乾燥・アレルギーがなくなった		スベスベ、ツヤ・ハリ↑シワ浅くなり若返ったと言われた！				目尻・目の下の笑いジワが減った	
	経過観察期間	7ヶ月		5ヶ月		6ヶ月		7ヶ月		8ヶ月		8ヶ月		8ヶ月		7ヶ月		11ヶ月	4ヶ月	4ヶ月		8週											
	症状改善期間	3-12週	1-10週	4-19週	1-12週	2-24週	6-20週	1-18週	1-18週	2-8週	1-6週	1-20週	4-8週	1-10週	1-8週	1-18週	2-18週	4-5ヶ月	1-16週	2-8週		4-6週	8週										
<首>		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L										
元の血小板数		39.7		23.7		41.9				22		22.8		23.8																			
P	作製方法	既製品	柴田式	既製品	既(+T)	柴田式	柴(+T)			既製品	柴(+T)	準柴田式	準柴(+T)	柴(+T)	既製品																		
R	血小板濃度	53	248	38	38	292	292			43	107	95	95	144	58																		
P	濃縮度	1.3倍	6倍	1.6倍	1.6倍	7倍	7倍			2倍	5倍	4.2倍	4.2倍	6倍	2.4倍																		
	注入量	1	0.5	1.2	1.2	1.5	1.5			2.6	1.5	1	1	1	0.7																		
	シワ	○	◎	×	×~△	◎	◎			△	◎	◎	◎	○	△																		
	黒ずみ	○	◎	×	×~△	◎	◎			△	◎	◎	◎	○	△																		
	経過観察期間	7ヶ月		5ヶ月		6ヶ月				8ヶ月		7ヶ月		8ヶ月																			
	症状改善期間	2-19週	1-19週		5-6週	2-16週	2-16週			6-22週	1-10週	1-15週	1-15週	3-7週	3-5週																		
<手>		R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L										
元の血小板数		23.7		40.1		27.2		21		22.8		23.8																					
P	作製方法	柴田式	柴(+T)	柴(+T)	既製品	柴田式	既製品	既(+T)	既製品	柴(+T)	柴田式	既製品	既(+T)	柴(+T)	既製品																		
R	血小板濃度	127	127	380	100	172	44	36	36	145	145	58	58																				
P	濃縮度	5.4倍	5.4倍	9.5倍	2.5倍	6倍	1.6倍	1.4倍	1.4倍	6.5倍	6.5倍	2.4倍	2.4倍																				
	注入量	1	1	3	2.6	1	2.5	1.7	1.7	1	1	0.7	0.7																				
	シワ	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	△	△																				
	シミ・色黒	○	◎	◎	○	◎	○	◎	◎	◎	◎	○	○																				
	手触り	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○																				
	手荒れ	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○																				
	感想・その他	白くスベスベ(R=L)		ふっくら暖か(血行良)		スベスベ白い(R>L)		コンシーラー・クリーム不要になった		小ジワが減って手荒れがなくなった		ふっくら白くなった		ふっくらスベスベ		きめ細かく色白くなった																	
	経過観察期間	5ヶ月		6ヶ月		7ヶ月		8ヶ月		7ヶ月		8ヶ月																					
	症状改善期間	1-12週	1-16週	5-11週	5-11週	2-18週	2-18週	2-32週	2-32週	1-9週	1-7週	2-11週	1-11週																				
		◎著明に改善		○改善		△少し改善		×変化なし		—症状なし		(+T):自己トロンピンを添加																					

準柴田式:既製の試験管を使用し、柴田式の作製方法で作製